

AVERTISSEMENTS AGRICOLES


(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription

PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

 (95) 36.05.70


Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 66
 du 8 Octobre 1985

- * - Traitez dès maintenant les **processionnaires du pin**
- * - Les **cicadelles vertes** des agrumes sont parfois abondantes
Intervenez dans les brise vents
- * - Les ravageurs du **colza** (2 ème partie)

PIN :

Processionnaires du pin

Les éclosions se poursuivent et les jeunes chenilles peuvent- être traitées dès la semaine prochaine sur l'ensemble de la CORSE.

* - Préférez des produits biologiques à base de *bacillus thuringensis* non toxiques pour l'homme et les animaux.

- **Thuricide** PM 0,6 kg / ha
- **Bactospéine** PM 1600 0,6 kg / ha
- **Dipel** PM 0,6 kg / ha

- * - Vous pouvez aussi utiliser le **diflubenzuron** : **Dimilin** 300 g/ ha
- * - Si les populations sont abondantes, effectuez un deuxième traitement dans les 15 jours
- * - N'attendez pas le printemps lorsque les chenilles quittent leurs nids d'hiver, il sera trop tard.
- * - Si les arbres sont hauts, vous pourrez cet hiver couper les nids. Les ouvrir, les arroser d'essence, et les brûler. Attention, ces chenilles sont urticantes.
- * - Préservez les mésanges, elles détruisent un grand nombre de chenilles.

P25

AGRUMES :

La population de cicadelles vertes augmente dans les parcelles voisines de vignes. Effectuez dès maintenant un traitement insecticide des brise vents.

Si les brise vents sont constitués de casuarina, traitez le premier rang de clémentiniers.

COLZA :

Surveillez attentivement votre culture de la levée au stade deux feuilles vraies.

Prenez garde aux limaces

Décelez la présence de limaces en mettant des granulés anti limaces sous des abris (ex : tuiles, ou vieux sacs d'engrais) .

Si vous notez la présence de limaces mortes, intervenez le soir de préférence avec :

- * - MESUROL anti limaces: 3 kg/ ha
- * - ou des granulés à base de métaldehyde (NS)
15 à 30 kg /ha



Quelque soit le produit épandez régulièrement environ 30 granulés par m²

Prenez garde aux altises

*** Comment les piéger :

Enterrez des cuvettes jaunes au niveau du sol (au moins deux par parcelles) les remplir d'eau + mouillant (liquide vaisselle par exemple)

*** les reconnaître :

les adultes mordent les feuilles et peuvent entraîner leur disparition

les larves minent les pétioles et provoquent un affaiblissement des plantes

*** Observez les dégâts

Si vous observez des morsures, (trous de quelques mm) intervenez avec un insecticide si un pied sur trois ou quatre est atteint.

Parathion Methyl
Alphamethrine
Cyfluthrine
Cypermethrine

Deltamethrine
Fenvarélate

NS

FASTAC 10 : 0, 1 l / ha
BAYTHROID : 0, 3 l / ha
CYMBUSH : 0, 25 L / ha
MASTOR : 0, 4 l / ha
RIPCORDER : 0, 5 l / ha
KAFIL : 0, 25 l / ha
DECIS : 0, 3 l / ha
SUMICIDIN : 0, 5 l / ha

couleur bleu noir brillant
4 mm de long



Préférez les pyrethrinoïdes au parathion, leur efficacité est de 20 jours